

الملخص

المقدمة: يُعتبر الاختناق حول الولادة أحد الأسباب الرئيسية لمرضاة ووفيات الولدان في البلدان النامية، حيث يبلغ معدّل حدوثه 1.5 لكل ألف ولادة. ويحتلّ المرتبة الثالثة كسبب لوفيات الولدان. وقد أظهرت الدّراسات أن هناك عوامل خطر مرتبطة بالاختناق تحدث قبل الولادة وأثناءها. الهدف: تحديد العوامل المتنوّعة التي تؤدّي إلى الاختناق حول الولادة لدى الولدان في مستشفى تشرين الجامعيّ في اللاذقيّة . طرق الدّراسة: دراسة رصدية تحليليّة (حالات- شواهد)، أُجريت في شعبة العناية المشدّدة الوليديّة في مستشفى تشرين الجامعيّ في اللاذقيّة في عامي 2022-2023. شملت مجموعة الحالة الولدان مع مشعر أبعاد في الدّقيقة الخامسة أقل من 7، ومجموعة الشّاهد الولدان مع مشعر أبعاد في الدّقيقة الخامسة أكثر أو يساوي 7. تمّ جمع البيانات من خلال استبيان خاص بالدّراسة وأخذ قصّة سريريّة مفصّلة عن الأم والوليد. تمّ إدخال وتحليل جميع البيانات باستخدام برنامج SPSS_25. النتائج: شملت الدّراسة 56 وليداً، تم تقسيمهم إلى مجموعتي حالة وشاهد. أظهر التّحليل المتعدّد المتغيّرات أنّ تعقّي السائل الأمنيوسي (p=0.0001 ، 95%CI 2.2-8.9 ، RR 4.1) وانبثاق الأغشية الباكر (p=0.0001 ، 95%CI 1.3-10.7 ، RR 2.9) والولادة الطّبيعيّة مع مخاض عسير (p=0.0001 ، 95%CI 1.4-9.5 ، RR 2.2) هي عوامل الخطر للاختناق حول الولادة. الخلاصة: إنّ تعقّي السائل الأمنيوسي، انبثاق الأغشية الباكر، والولادة الطّبيعيّة مع مخاض عسير هي عوامل الخطر للاختناق حول الولادة. تعدّ معرفة هذه العوامل خطوة مهمّة في اتّخاذ التّدابير الوقائيّة الباكرة وتحسين جودة الرّعاية في الفترة المحيطة بالولادة والاستعداد المثالي للولادات عالية الخطورة.